




En suelos calcáreos de 1000-1500 m.
Raro. Grazalema.
Distribución general. SW de Europa,
N de Africa, W y SW de Asia.

3. *Scandix stellata* Banks & Solander in A. Rusell, *Nat. Hist. Aleppo*, ed. 2, 2: 249 (1794)

S. pinnatifida Vent. var. *velutina* Cosson, *Not. Pl. Crit.* 38 (1849)

Tallos de 6-30 cm, generalmente tomentosos. Hojas 2-3 pinnatisectas, con lóbulos terminales lineares u oblongos. Umbelas con 1-2 (-3) radios. Involucelo con 3-5 bracteolas pinnadas, sin margen escarioso. Frutos de 10-22 mm, con pico comprimido dorsalmente 2-3 (-4) veces más largo que la parte portadora de la semilla; vitas no aparentes. Estilos de 0,1-0,2 (-0,3) mm. $2n = 16, 20$. *Florece de Marzo a Mayo*.



8. *Bifora* Hoffm., *Gen. Umb.*, ed. 2, XXXIV, 191 (1816), nom. cons. (*)

Hierbas anuales. Hojas 2-pinnatisectas. Inflorescencias generalmente con brácteas y bracteolas. Sépalos ausentes. Pétalos ligeramente emarginados, con ápice inflexo, blancos. Frutos dídimos, con mericarpos subglobosos, rugosos en toda su superficie, con pico corto, unidos por una zona comisural pequeña; costillas no apreciables incluso en sección transversal; vitas no aparentes. Endospermo cóncavo.




Márgenes de cultivos y viaria.
Frecuente. Sierra Norte, Campiña
Alta, Subbética, Grazalema, Algeciras.
Distribución general. Regiones
Mediterránea y Macaronésica.

1. *Bifora testiculata* (L.) Roth, *Enum.* 1 (1): 888 (1827)

Coriandrum testiculatum L., *Sp. Pl.* 256 (1753)

Tallos de 8-70 cm, ramificados desde la base. Hojas basales 2-pinnatisectas, con lóbulos terminales linear-oblongos, mucronados; las caulinares 2-pinnatisectas, con lóbulos terminales lineares. Umbelas con 1-3 radios, sin brácteas o con 1 bráctea. Involucelo con 2-3 bracteolas casi tan largas como los pedicelos. Mericarpos de 3,5-5 × 3,5-4 mm. Estilos de 0,1-0,2 mm. $2n = 22$ (Sevilla). *Florece de Marzo a Mayo*.



(*) Por F. García Martín