

Cette plante est extrêmement affine à l'*H. Salzmanni* Boiss. et Reut. Diagn. Pl. or., 2, p. 201 ; Pugill., p. 42, dont elle peut être considérée comme une sous-espèce à gousses étroites, allongées, peu courbées, plus papilleuses et plus étranglées dans les sinus, et à folioles plus étroites. Elle avait déjà été récoltée dans la forêt de la Mamora par GRANT, et elle avait été confondue par COSSON (*in herbario*) avec l'*H. Salzmanni*. Dans l'Herbier BOISSIER ces deux plantes, provenant des environs de Tanger, sont également confondues, mais les spécimens d'*H. Salzmanni*, conservés dans l'Herbier COSSON, provenant de BOISSIER d'une part et de REUTER de l'autre, appartiennent uniquement à la plante à gousses larges que nous considérons comme le véritable *H. Salzmanni*, en nous appuyant sur le texte du *Pugillus*, p. 42 : «legumina..... latoria 2 lineas aut amplius lata ».

Trachyspermum involucreatum Maire, n. sp. — Annuum ; radix tenuis palaris. Caulis 20-30 cm altus, in speciminibus normalibus erectus ramosus, in speciminibus putatis a basi ramosus ramis erecto-patulis, striatus, subteres, laxe foliosus. Folia ambitu ovato-triangularia, glabra, viridia, non l. vix scabra, 2-3-ternatisecta, in vagina *anguste albo-scarioso-marginata apice attenuata* petioliformi sessilia l. breviter petiolata ; laciniae *elongatae, anguste lineares, subcanaliculatae, acutae, saepe subaristatae*, in foliis inferioribus latiores. Umbellae oppositifoliae pedunculo demum erecto-patulo *folio multo longiore* suffultae. *Involucreum* ex 1-4 phyllis lineari-lanceolatis integris l. 2-3-fidis, angustissime albo-marginatis, plerumque mox deciduis, constans, saepius prorsus nullum ; radii primarii 5-11, plus minusve inaequales, angulosi, laeves ; umbellulae *semper involucrellatae* ; involucrelli phylla plerumque 6-7 lineari-lanceolata, 1-nervia, margine albo-scariosa, apice sensim et longe acuminata acuta, plerumque incurvata, umbellulam floriferam aequantia l. superantia, fructiferam subaequantia ; radii secundarii fructiferi inaequales angulati, in angulis scabriusculi, fructu valde longiores. Calycis dentes prorsus obsoleti. Petala alba non l. vix unguiculata, late obcordata, in sinu angusto profundo lobulo involuto interdum crispato praedita. Stylopodium bi-hemisphaerico-conoideum, margine subintegro *non l. vix depressum* ; styli reflexi stylopodio longiores ; diachaenium rotundatum lateraliter compressum, dein didymum 1,2-1,5 mm longum ; carpophorum liberum apice bifidum ; mericarpia matura extus valde convexa, angulosa ; costae primariae omnes extra-commissurales albidae filiformes papillosae *papillis rotundatis* ; valleculae atro-fuscae papillis rotundatis laxis albidis conspersae, costis secundariis expertes, omnes 1-vittatae et meridocytis praeditae ; seminis facies commissuralis fere plana. Planta trita odorem *Anethi graveolentis* laevem spirat.

Hab. in rupestribus et pascuis aridis Imperii Marocani australis,