

berulento. Brácteas involucrales marcadamente carenadas, con margen escarioso, denticulado-lacerado; las externas lanceoladas; las internas ovadas. Brácteas interseminales generalmente panduradas, puberulentas. Flores con tubo de c. 2 mm y limbo de c. 1,5 mm. Aquenios de 1,5-1,8 mm, trígonos o tetragonos. *Florece y fructifica de Mayo a Agosto.*

35. *Tanacetum* L., *Sp. Pl.* 843 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5: 366, 1754] (*)

Hierbas anuales o perennes, caulescentes. Hojas enteras o pinnatisectas. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas involucrales con margen escarioso. Receptáculo cónico, sin brácteas interseminales. Capítulos discoideos y homógamos, con todas las flores flosculosas y hermafroditas, o radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas y femeninas, medias bilabiadas y hermafroditas e internas flosculosas y hermafroditas. Aquenios obcónicos, con c. 10 costillas longitudinales. Vilano reducido a una pequeña corona dentada.

1. Capítulos radiados. Perenne 1. *parthenium*
 1. Capítulos discoideos. Anual 2
 2. Hojas medias de los tallos laterales de menos de 4 (-6) mm. Brácteas involucrales internas con ápice subagudo, blanquecino 3. *microphyllum*
 2. Hojas medias de los tallos laterales de más de 8 mm. Brácteas involucrales internas con ápice muy obtuso o casi truncado, amarillo 2. *annuum*



Zonas montaas húmedas a 600 m. Aracena.

Distribución general. Oriundo del E del Mediterráneo, W y SW de Asia, se encuentra posiblemente naturalizado en la mayor parte de Europa y Macaronesia.

1. *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip., *Tanac.* 55 (1844)

Matricaria parthenium L., *Sp. Pl.* 890 (1753)

Pyrethrum parthenium (L.) Sm., *Fl. Brit.* 2: 900 (1800)

Perennes, rizomatosas, glabrescentes. Tallos de 60-80 cm, estriados, muy ramificados. Hojas pecioladas, pinnatisectas o pinnatipartidas, con lóbulos anchos, planos, crenados, subglabras o ligeramente pubérrulas. Capítulos largamente pedunculados, formando un corimbo laxo. Involucro de 6-7 mm de anchura. Brácteas involucrales linear-elípticas, con ápice escarioso agudo. Capítulos radiados. Flores externas hemiliguladas, con limbo de 6-7 mm, blanco; las medias bilabiadas y hermafroditas pero funcionalmente femeninas, blanquecinas, con labio externo de c. 1 mm y bidentado y labio interno de 2-2,5 mm, ligeramente tridentado; las internas de 1,5-2,5 mm, flosculosas. Aquenios de c. 1,5 mm, obcónicos, con c. 10 costillas longitudinales. Corona de c. 0,2 mm. $2n = 18$. *Florece y fructifica en Julio.*



(*) Por S. Talavera