

extérieures ovales lancéolées, acuminées en longue pointe étalée, blanche un peu calleuse au sommet ; les plus intérieures oblongues, membraneuses aux bords et au sommet presque contracté en pointe obtuse ciliolée. Akènes ..... Feuilles radicales nombreuses, pétiolées, pennatifides, à rachis très étroit et denté, ainsi que les lobes distants linéaires, terminés en pointe blanche calleuse ; les caulinaires semblables, sessiles, auriculées embrassantes, la supérieure bractéiforme. Racine verticale annuelle ou indurée subperennante. (Feuilles du *R. angustifolia* ; calathides égalant celles de *R. quercifolia*). — Fl. avril.

Sables des oasis : Ksar Metlili.

### **Taraxacum getulum.**

Scapes courts ; péricline grand à folioles extérieures étroitement lancéolées, appliquées, pubérulentes au sommet ; les intérieures linéaires, presque aussi larges, obtuses peu ou point calleuses au sommet. Akènes gris comprimés, oblancéolés, à costules lisses dans le bas, ou tuberculées dans les plus extérieurs, muriculées dans le haut à spinules égales ascendantes, fortement dépassées par le rostre. Scape de l'aigrette presque deux fois long comme l'akène et comme l'aigrette, un peu claviforme au sommet, long de 7<sup>mm</sup>. Feuilles étalées roncinées à lobes lancéolés peu inégaux, dentelés çà et là, très récurves. Plante glabre. — Fl. avril.

Terrains sablonneux de la région des Ksours : Arbaouat.

Erratum de la page 9 : c'est le *T. dens-leonis* ou plutôt *officinale* Wig., que je n'ai point encore vu de l'Algérie ; le *T. lævigatum* au contraire, ou une de ses formes à akènes plus grands, à aigrette plus longuement stipitée, se retrouve jusque dans la région des cèdres de Blida et de l'Aurès.

### **Phœnicopus intricatus** (ou *Lactuca intricata*)

Péricline égalant l'aigrette, à folioles extérieures courtes