

*A. candolleanus* (Zollik. *candolleana*, Coss.). — Mou-el-Glouta au S. de Tiaret.

*A. resedifolius* (Zollik. *resedifolia*, Coss.). — Berezina, Metlili.

*A. angustifolius* (Zollik. *angustifolia*, Coss.). — Maïa, Metlili, Biskra.

*A. quercifolius* (Zollik. *quercifolia*, Coss.). — Gabès, Metlili ?

### **Taraxacum inaequilobum.**

Péricline à folioles externes lâchement appliquées, peu calleuses au sommet, scariées aux bords, petites et peu inégales. Akènes gris, rugueux, granulés dans le bas, muriqués dans le haut, les dentelons dressés autour du bec et égalant presque sa base persistante ; partie grêle et caduque égalant l'aigrette et l'akène. Feuilles appliquées sur le sol, roncées à lobes ovales ou oblongs, très obtus, alternant avec des lobules semblables dans les sinus. Scapes grêles paraissant avec les premières feuilles. Plante vivace, verte, à floraison uniquement automnale.

Lieux herbeux des montagnes : Zaccar de Miliana.

### **Taraxacum microcephalum.**

Calathides petites sur des scapes très grêles, beaucoup plus courts que les feuilles. Péricline à folioles extérieures petites, linéaires, atténuées, lâchement embriquées, membranées aux bords, à peine calleuses au sommet. Akènes les plus petits du genre, gris, peu comprimés, lisses, au moins pour la plupart, à dents de la coronule longuement dépassées par la base persistante du bec ; partie grêle du bec plus longue de  $\frac{1}{4}$  que l'akène et que l'aigrette appauvrie. Feuilles longues, minces, glabres, roncées, à lobes espacés, triangulaires, obtus, plus ou moins dentés. — Fl. juin.

Escarpements rocheux : Zouïa, près Garrouban.