

2. *Torilis arvensis* (Hudson) Link, *Enum. Horti Berol. Alt.* 1: 265 (1821)

Caucalis arvensis Hudson, *Fl. Angl.* 98 (1762)

Pubescentes. Tallos de 20-100 cm. Hojas basales 2 (-3) pinnatisectas; las caulinares 2 pinnatisectas o trifoliadas. Umbelas con pedúnculos generalmente de más de 6 cm, con 2-12 radios y 0-1 brácteas. Umbelas de segundo orden con numerosas bracteolas. Frutos de 2,8-6,4 mm.

- 1. Umbelas con 5-12 radios. Estilos de 1-1,8 mm **a. subsp. *neglecta***
- 1. Umbelas con 2-3 (-4) radios. Estilos de 0,2-0,4 mm 2
- 2. Hojas caulinares superiores trifoliadas; las basales 2 pinnatisectas. Umbelas generalmente con 3 radios **b. subsp. *purpurea***
- 2. Hojas caulinares y basales 2 pinnatisectas. Umbelas generalmente con 2 radios **c. subsp. *elongata***

a. subsp. *neglecta* (Sprengel) Thell. in Hegi, *Ill. Fl. Mitteleur.* 5 (2): 1055 (1926)

Torilis neglecta Sprengel in Roemer & Schultes, *Syst. Veg.* 6: 484 (1820)

T. infesta (L.) Sprengel var. *neglecta* (Sprengel) Lange in Willk. & Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* 3: 15 (1874)


Hojas basales 2 (-3) pinnatisectas, con lóbulos terminales oblongos, irregularmente dentados; las caulinares 1-2 pinnatisectas. Umbelas con pedúnculos de 6-12 cm, con 5-12 radios y 0-1 brácteas lineares o setáceas. Frutos de 2,8-6 mm. Estilos de 1-1,8 mm, 5-8 veces más largos que el estilopodio. $2n = 12$ (Sevilla). *Florece en Mayo; fructifica en Junio.*

b. subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beib.* 30 (1): 1057 (1927)

Caucalis purpurea Ten., *Corso Bot. Lez.*, ed. 2, 4: 209 (1823)

Torilis purpurea (Ten.) Guss., *Fl. Sic. Prodr.* 1: 325 (1827)

Hojas basales 2 pinnatisectas; las caulinares medias trifoliadas, con folíolos linear-lanceolados, enteros o serrados, el central más largo que los laterales; las más superiores frecuentemente simples, lineares, enteras o dentadas. Umbelas con (2-) 3 (4-) radios. Frutos de 3-4 (5-) mm. Estilos de 0,2-0,4 mm, tan largos o ligeramente más largos que el estilopodio. $2n = 12$. *Florece en Mayo; fructifica en Junio.*



Frecuente en márgenes de cultivos, cunetas y herbazales nitrófilos. Todo el territorio.
Distribución general. C y S de Europa, N de Africa, SW de Asia, Macaronesia.



Márgenes de cultivos y caminos, pastizales de terófitos y herbazales nitrófilos. Todo el territorio.
Distribución general. S de Europa, N de Africa, SW de Asia, Macaronesia (Canarias).

