




Sobre calizas. Grazales.  
Distribución general. Región  
Mediterránea.

c. subsp. **elongata** (Hoffmanns. & Link)  
Cannon, *Feddes Reperit.* 79: 62 (1968)

*Caucalis elongata* Hoffmanns. & Link,  
*Fl. Port.* 2: 392 (1820-1828)

Hojas 2 pinnatisectas; las caulinares generalmente más pequeñas que las basales. Umbelas con 2 (-3) radios. Frutos de 3,6-6,4 mm. Estilos de 0,2-0,4 mm, tan largos como el estilopodio. *Florece de Abril a Mayo; fructifica de Mayo a Junio.*

Existen formas intermedias entre este taxón y *T. leptophylla* de difícil determinación.



Frecuente en todo el territorio.  
Distribución general. W y S de  
Europa, NW de África, SW de Asia,  
Macaronesia.

3. ***Torilis leptophylla*** (L.) Reichenb. fil. in  
Reichenb. & Reichenb. fil., *Icon. Fl.*  
*Germ.* 21: 83, t. 169 (1866)

*Caucalis leptophylla* L., *Sp. Pl.* 242  
(1753)

Pubescentes. Tallos de 10-30 (-40) cm, erectos. Hojas basales 2 pinnatisectas con lóbulos terminales oblongos o lineares; las caulinares subsentadas, 1-2 pinnatisectas. Umbelas con pedúnculo de 1,5-5 (-6) cm, generalmente opuestas a las hojas, con 2-3 (-4) radios, sin brácteas. Umbelas de segundo orden con 3-5 bracteolas linear-lanceoladas. Pétalos blancos. Frutos de 3-6 (-8) mm, oblongoideos, con espinas a veces recurvas, amarillo-pajizas. Estigmas sentados o subsentados.  $2n = 12$  (Cádiz). *Florece de Abril a Mayo; fructifica de Mayo a Junio.*

