

70. *Urospermum* Scop., *Introd.* 122 (1777) (*)

Hierbas anuales o perennes, caulescentes, espinuloso-setosas al menos en la base del tallo y nervio medio de las hojas por el envés. Hojas alternas, en parte formando una roseta basal, a veces las superiores subopuestas o subverticiladas, de dentadas a pinnatifidas; las caulinares sentadas, amplexicaules. Capítulos solitarios, terminales, largamente pedunculados. Involucro con 2 filas de brácteas soldadas en el 1/3 inferior y simulando una sola fila. Brácteas involucrales internas con margen escarioso ancho y glabro; las externas sin margen escarioso o con margen escarioso ancho en uno de los lados. Receptáculo glabro, sin brácteas interseminales. Lígulas amarillas, densamente vilosas, al menos en la parte superior del tubo y en la base del limbo por el dorso. Aquenios comprimidos lateralmente, con 4-6 costillas transversalmente tuberculadas, con pico; pico inflado en la base y escábrido o espinuloso en la parte superior. Vilano formado por una fila de pelos plumosos.

Involucro glabro, con numerosas setas espinulosas y blancas. Flores externas con limbo de hasta 9 mm. Anual 1. *picroides*
 Involucro pubescente. Flores externas con limbo de más de 12 mm. Perenne ..
 2. *dalechampii*



Ruderal y arvense. Muy común.
 Todo el territorio.
Distribución general. S y SW de Europa, N de Africa, W y SW de Asia, Macaronesia.

1. *Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt, *Samml. Phys. Aufs. Naturk.* 275 (1795)



Tragopogon picroides L., *Sp. Pl.* 790 (1753)

Anuales. Tallos de 20-60 (-80) cm, generalmente ramificados en la parte superior, densamente setoso-espinescentes, al menos en la mitad inferior. Hojas con margen dentado-espinescente, a veces glabrescentes; las inferiores y medias generalmente runcinadas. Capítulos largamente pedunculados, con pedúnculos glabros o setuloso-escábridos. Involucro de hasta 28 x 25 mm y cilíndrico en la fructificación, glabro con numerosas setas espinulosas y blancas. Lígulas con tubo de c. 6 mm y limbo de 7-9 mm; a veces las más externas con limbo rosado o violado en el dorso. Aquenios de 11-18 mm, con pico de 8-12 mm y marcadamente inflado en la parte inferior. Vilano de 9-12 mm, caduco, blanco. 2n = 10 (Sevilla). *Florece y fructifica de Marzo a Mayo.*

2. *Urospermum dalechampii* (L.) Scop. ex F. W. Schmidt, *Samml. Phys. Aufs. Naturk.* 276 (1795)

Tragopogon dalechampii L., *Sp. Pl.* 790 (1753)

Perennes. Tallos simples o ramificados, con hojas sólo en la mitad inferior, ligeramente setulosos en la mitad superior, escabrescentes en la superior. Hojas pubescentes; las más inferiores pecioladas, pinnatisectas, generalmente runcinadas; las más superiores enteras, subopuestas o subverticiladas. Capítulos largamente pedunculados, con pedúnculos puberulento-escábridos. Involucro de 17-20 x 15-23 mm, cilíndrico en la



Pastizales y taludes de suelos generalmente básicos. Raro. Litoral, Marisma, Campiña Alta sevillana.
Distribución general. W de la Región Mediterránea (excepto Portugal), Yugoslavia.

(*) Por S. Talavera